

Renseignez-vous. Restez informés. Protégez-vous.

L'épidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) présente des défis uniques pour les forces de l'ordre, l'un de ces défis étant de traiter en toute sécurité un suspect de conduite sous influence (CSI) au moment approprié, et conformément aux directives de chaque agence. Cet outil fournit des considérations supplémentaires pour protéger les agents de police et les sujets d'une éventuelle exposition au COVID-19.

Sur la base des recommandations des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis¹ et des représentants médicaux et du comité scientifique du Groupe consultatif technique de l'IACP pour le [Programme d'évaluation et de classification des Médicaments \(DEC\)](#), les conseils suivants sont uniquement destinés à réduire le risque d'exposition




faciaux doivent être utilisés à une distance de 2 mètres du sujet, si possible. Un masque facial sur le sujet augmente la sécurité des agents et peut être retiré lors d'un examen de la cavité buccale.



L'IACP conseille vivement les services de police à envisager les précautions renforcées suivantes pour les agents et les experts en reconnaissance de drogues (ERD) pendant le traitement de CSI:

1. Efforcez-vous de maintenir une **distance de 2 mètres** et de limiter la proximité sans EPI à moins de **5 minutes au total**.



2. Utilisez les précautions appropriées pour les tests de l'haleine. Au cours de la crise actuelle de coronavirus, envisagez des analyses de «sang uniquement», si cela est autorisé par la politique de votre juridiction.
3. Envisagez de conduire le traitement de CSI et les évaluations de ERD dans une zone avec un **bon échange d'air** (où le sujet va souffler loin de l'agent), dans une grande pièce lorsque cela est possible, et avec des précautions de sécurité appropriées, y compris l'utilisation de **gants jetables** et d'autres **équipements de protection individuelle**. Les ERD devraient envisager d'ajouter un **écran facial** à votre kit ERD (comme celui illustré ou similaire). L'examen de la cavité buccale lors d'une évaluation de ERD présente la composante la plus à risque - Déplacez-vous d'un côté à l'autre pour obtenir une meilleure vue et évitez de vous tenir directement face au sujet. Les écrans

4. Pensez à poser au sujet des questions d'entrevue supplémentaires:
 - a. Avez-vous reçu des traitements médicaux liés au COVID-19?
 - b. Avez-vous eu de la fièvre ou des frissons au cours des derniers jours? (Cependant, rappelez-vous que les effets de certaines drogues d'abus courantes peuvent donner ces sensations).
 - c. Avez-vous des symptômes de «rhume»? Toux, nez qui coule, mal de gorge?

En cas de suspicion de COVID-19, contactez un professionnel de la santé qualifié pour évaluer e transporter le sujet dans un établissement de santé, le cas échéant.

5. Faites un lavage/désinfection des mains approprié à la fin du contact.

