

Informe-se. Conscientize-se. Fique seguro.

O surto do Corona vírus 2019 (COVID-19) apresenta desafios singulares para o trabalho no trânsito. Um deles é justamente a abordagem segura de um motorista suspeito de estar dirigindo sob influência de álcool ou drogas, quando apropriado, e conforme as diretrizes de cada localização. Aqui temos algumas considerações adicionais para manter os agentes, motoristas e transeuntes protegidos de uma possível exposição ao COVID-19.

Com base nas recomendações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA¹, de representantes médicos e do comitê científico do Painel Consultivo Técnico da IACP para o [Programa de Avaliação e Classificação de Medicamentos \(DEC, na sigla em inglês\)](#), a orientação a seguir tem como objetivo reduzir o risco de exposição de policiais e agentes de trânsito em suas atividades.




outro para ter uma visão melhor e evitar ficar em pé diretamente na frente da pessoa. Protetores faciais devem ser usados a uma distância de um metro e meio do objeto, se possível.

Sugerimos também o uso de proteção facial na pessoa sendo examinada, pois aumenta a segurança do agente e pode ser removida durante o exame de cavidade oral.



A IACP sugere aos departamentos de polícia e de trânsito que considerem as seguintes precauções adicionais para os agentes e peritos em reconhecimento de drogas nos trabalhos de fiscalização de trânsito:

1. Procure manter uma **distância de aproximadamente 2 metros** e limitar o tempo de proximidade sem uso de EPI para menos de 5 minutos no total.



2. Tome as precauções apropriadas para o teste do bafômetro. Durante a atual crise do corona vírus, dê preferência ao exame de sangue apenas, caso seja permitido na sua jurisdição.
3. Procure fazer o teste de bafômetro e dos exames feitos pelo perito em reconhecimento de drogas em uma área com **boa ventilação** (onde a pessoa possa assoprar o bafômetro a uma distância segura do agente / perito), em uma sala grande, quando possível, e com as devidas precauções de segurança, incluindo o uso de **luvas descartáveis** e outros **equipamentos de proteção pessoal**. Os peritos em reconhecimento de drogas devem considerar adicionar uma proteção para o rosto ao seu kit de equipamento de trabalho (como este mostrado ou semelhante). O exame da cavidade oral durante o exame pericial apresenta o componente de maior risco, portanto, mova-se de um lado para o

4. Considere fazer algumas perguntas adicionais na inspeção, tais como:

- a. Você recebeu algum tratamento médico relacionado ao COVID-19?
- b. Você teve febre ou calafrios nos últimos dias? (Lembre-se, no entanto, que os efeitos de algumas drogas de abuso comuns podem causar essas sensações).
- c. Você tem algum sintoma de “resfriado”? Tosse, coriza, dor de garganta?

Se houver suspeita de COVID-19, entre em contato com um profissional de saúde treinado para fazer uma avaliação e transporte o paciente para um estabelecimento de saúde, se apropriado.

5. Lave / higienize as mãos de forma adequada após o contato.

